



٣



٣

## امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٥

(وثيقة معمية/محلود)

مدة الامتحان:  $\frac{٣٠}{١}$  س  
اليوم والتاريخ: الخميس ٢٦/٦/٢٠٢٥  
رقم الجلوس:

المبحث : الإنتاج النباتي / الورقة الأولى، ف ١ رقم المبحث: 327

رقم النموذج: (١)

الفرع: الزراعي

اسم الطالب:

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلل بشكل غامقدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك، علماً أنَّ عدد الفقرات (٤٠)، وعدد الصفحات (٤).

١- من أنواع اللوزيات، يحتاج إلى زراعة أكثر من صنف في البستان الواحد، هو:

- (أ) المشمش      ب) الكرز الحلو      ج) الدرّاق

٢- درجة الحرارة التي تُحسب عندها ساعات البرودة لاحتياجات أنواع اللوزيات في فصل الشتاء، هي:

- (أ)  $٠٧^{\circ}\text{S}$       ب)  $٠٨^{\circ}\text{S}$       ج)  $٠٨,٥^{\circ}\text{S}$

٣- السبب الرئيس لتجنب استعمال أصل البرقوق على نطاق واسع، هو:

- (أ) لا تصلح زراعته في الأراضي الرطبة      ب) لا يتحمل الأرضي الكلسية

- ج) لا يتوافق مع أصناف الدرّاق والنكتارين الثعبانية      د) لا يقاوم الديدان الثعبانية

٤- الهدف من حراثة الأرضي المرويّة خلال فصل الصيف في بساتين اللوزيات:

- (أ) التخلص من الكدر      ب) تجنب تشکل الطبقة الصماء

- ج) التخلص من الأعشاب      د) خلط الأسدة الكيميائية

٥- تستعمل مادة الأثيريل في أشجار الكرز لتسريع نضج الثمار بتركيز (جزء بالمليون) يُقدّر بـ:

- (أ) ٥٠      ب) ١٠٠      ج) ١٥٠      د) ٢٥٠

٦- الموطن الأصلي للفاح البري، هو:

- (أ) أمريكا اللاتينية      ب) الصين      ج) إفريقيا      د) جبال قوقاز

٧- صنف الفاح الذي يحتاج إلى ساعات برودة متقدمة لا تزيد على (٥٠٠ ساعة) ببرودة، هو:

- (أ) جولدن بيلشص      ب) دورست جولدن      ج) ديلشص      د) جراني سميث

٨- جميع أصول الفاح الآتية تُزرع على أبعاد تتراوح بين ( $٢,٥ \times ١,٥$  م)، ما عدا:

- (أ) M9      ب) M26      ج) M27      د) MM111

٩- الحل المناسب لمشكلة عدم التوافق بين أصل السفرجل المُقرَّم نسبيًّا وبعض أصناف الكمثرى إجراء التركيب المزدوج، وذلك من خلال تعليمي أصل السفرجل بالكمثرى المُسمَّاة:

- (أ) بارتليت ثم التطعيم بصنف الكمثرى المطلوب      ب) بوسك ثم التطعيم بصنف الكمثرى المطلوب

- ج) هاردي ثم التطعيم بصنف الكمثرى المطلوب      د) ونترنيلز ثم التطعيم بصنف الكمثرى المطلوب

الصفحة الثانية

- ١- يتميز صنف السفرجل شاميون بـ:

  - ثماره صغيرة الحجم مُنتظمة الشكل
  - أشجاره كبيرة الحجم
  - دخول أشجاره مرحلة الإثمار المبكر
  - ثماره ذات اللون الأصفر الفاتح، ونكهته تشبه نكهة الأناناس

١١- تحمل الأزهار على أشجار الحمضيات في نورات عنقوية:

  - جانبياً وقليلاً على النموات الحديثة في الموسم السابق، وعلى النموات الموسمية
  - قليلاً في نهاية طرود ثمرة قصيرة، أو طويلة عمرها سنة واحدة
  - قليلاً على دوابير ثمرة محمولة على أغصان عمرها سنتان أو أكثر
  - جانبياً على دوابير ثمرة عمرها سنتان، أو أكثر

١٢- النسيج الإسفنجي الأبيض الذي يحتوي على مواد بكتينية في ثمرة الحمضيات، هو:

  - القشرة الخارجية
  - الجزء الوسطي
  - الجزء الداخلي
  - البذرة

١٣- درجة حموضة (PH) التي تسبب ضعف نمو جذور الحمضيات، هي:

  - ٤
  - ٥
  - ٦
  - ٧

١٤- جميع الطرق الآتية متبعة في تكثير الحمضيات، ما عدا:

  - العقل الساقية المُتحشبة
  - الترقيد البسيط
  - الترقيد الهوائي
  - التطعيم

١٥- نوع العنقود الذهري في الموز:

  - راسيمي
  - جرابي
  - سنبلة مركبة
  - سيمي

١٦- من الظروف التي تتجح فيها زراعة الموز:

  - أن يكون مستوى الماء الأرضي أقل من متر
  - درجة الحرارة الملائمة (٢٧ °S)
  - زراعةه في الأماكن الظلية
  - درجة حرارة التربة (PH) تتراوح بين (٤-٥)

١٧- دلت التجارب المخبرية أنَّ الحالة الغذائية لنبات الموز جيدة إذا كان محتوى أوراقه من عنصر النيتروجين تقدَّر بـ:

  - ٠,١ %
  - ٠,٢ %
  - ٢,٦ %
  - ٣,٣ %

١٨- الهرمون الذي يستخدم لإنتصاج ثمار الموز، هو:

  - الإيثيون
  - الأوكسين
  - الجيبريلين
  - السايتوكاينين

١٩- جميع العوامل الآتية تؤثِّر في التمايز الذهري في الزيتون، ما عدا:

  - الرطوبة الأرضية
  - طول النهار
  - التقليم
  - التحليق

٢٠- المشكلة المتوقعة عند عدم توافر الرطوبة الأرضية الكافية خلال فترة التمايز الذهري لأشجار الزيتون في شهري شباط وأذار، هي:

  - ضمور مبایض الأزهار الأنوثية
  - نقص محتوى الثمرة من الزيت
  - صغر حجم الثمار
  - ضمور مبایض الأزهار الخنثى

### الصفحة الثالثة

٢١- المشكلة المتوقعة عند استخدام مواد كيميائية لقطف ثمار الزيتون بتركيز مرتفع، هي:

أ) موت البراعم الزهرية في الأشجار

ب) تأخير عملية الإزهار في السنة التالية

ج) تقليل تكوين المواد الكربوهيدراتية اللازمة لنمو الشمار والأشجار

د) انخفاض معدل وزن الشمار وكمية الزيت

٢٢- درجة الحرارة الدنيا للترية اللازمة لإثبات بذور البندورة، هي:

د)  $10^{\circ}\text{S}$

ج)  $20^{\circ}\text{S}$

ب)  $25^{\circ}\text{S}$

أ)  $30^{\circ}\text{S}$

٢٣- من أهداف إطالة فترات ريش نباتات البندورة كل (٧-١٠) أيام:

ب) تشجيع النمو الخضري الزائد

د) تحسين جودة الشمار

ج) مُئْنَع انتشار الأمراض الفطرية

٢٤- المنطقة التي يُزرع فيها البانجتان في منتصف شهر آذار زراعة مكشوفة ومحمية في الأردن، هي:

د) البدية

ج) المرتفعات

ب) الشفا غورية

أ) الأغوار

٢٥- تتجه زراعة البطاطا في جميع الظروف الآتية، ما عدا زراعتها في:

ب) أراضي رملية طينية مُفككة

أ) دورة زراعية مع محاصيل العائلة البانجانية

د) تربة جيدة الصرف والتقوية

ج) تربة درجة حموضتها (PH ٥,٢)

٢٦- عدد أشتال الفلفل اللازمة لزراعة (٣ دونمات)، إذا علمت أن المسافة بين المصاطب ٨٠ سم، وبين الأشتال ٣٠ سم:

د) ١٢٥٠٠

ج) ١٠٠٠٠

ب) ٣٧٥٠

أ) ١٢٥٠

٢٧- برنامج تسليم الأسمدة الكيميائية المركبة (N,P,K) المعتمد في الزراعة المروية لنبات الكوسا، هو:

أ) إضافة جميع الكميات دفعه واحدة عند زراعة البذور

ب) إضافة نصف الكمية عند زراعة البذور، والنصف الآخر عند ظهور الورقة الحقيقية الرابعة إلى السادسة

ج) إضافة جميع الكميات دفعه واحدة عند ظهور الورقة الحقيقية الرابعة إلى السادسة

د) إضافة ثلثي الكمية عند زراعة البذور، والثلث الآخر عند ظهور الورقة الحقيقية الرابعة إلى السادسة

٢٨- جميع الإجراءات الآتية تتبع لتهوية البيوت المحمية المزروعة بنبات الخيار، ما عدا:

أ) تنظيم عملية الري في البيوت البلاستيكية

ب) إزالة الفروع الجانبية السفلية القريبة من الأرض

ج) التأخير في إجراء عملية تربية نبات الخيار وتقطشه

د) فتح منافذ بين الشرائح البلاستيكية

٢٩- يتميز نبات البطيخ بأنه:

أ) وحيد الجنس وثنائي المسكن

ج) لا يحتاج إلى تلقيح خلطي

ب) غني بفيتامين ك (K)

د) وحيد الجنس ووحيد المسكن

## الصفحة الرابعة

- ٣٠- السبب الرئيس لأندفاف نبات الملفوف إلى الإزهار المبكر، هو:
- أ) انخفاض درجة الحرارة خلال تكوين الرؤوس إلى  $10^{\circ}\text{S}$
  - ب) الجو المعتدل المائل إلى البرودة خلال النصف الثاني من حياته
  - ج) انخفاض درجة الحرارة خلال تكوين الرؤوس إلى  $20^{\circ}\text{S}$
  - د) زراعة النبات في الأراضي الثقيلة إلى الخفيفة
- ٣١- من الآفات التي تصيب نبات الزهرة:
- أ) اللفحة المبكرة
  - ب) اللفحة المتأخرة
  - ج) عفن الساق الأسود
  - د) البياض الزغبي
- ٣٢- الحل الأمثل لمنع تكوين جذور فارغة، وحارة، وصغيرة لنبات الفجل، زراعته:
- أ) خلال فترة النهار الطويل
  - ب) في الأراضي متوسطة القوام
  - ج) خلال فترة النهار القصير
  - د) بطريقة السطور
- ٣٣- تُشرع بذور الفاصوليا زراعة محمية في مصاطب عرضها يتراوح بين:
- أ)  $(10-15)$  سم
  - ب)  $(60-70)$  سم
  - ج)  $(70-80)$  سم
- ٣٤- تنظم عملية الري لنبات البازلاء في مرحلة نمو القرون فتزداد حاجة النبات للماء، فتقصر فترات الري، وتزداد كمية الماء في الريّة الواحدة، وذلك لزيادة:
- أ) كمية القرون المكونة، وزيادة البذور فيها
  - ب) تعمق وانتشار الجذور في التربة
  - ج) تركيز العناصر الغذائية في البذور
  - د) النمو الخضري للنبات
- ٣٥- الضرر الذي قد يحدث عند زيادة الري في نبات الجزر، هو:
- أ) انخفاض نسبة الكاروتين
  - ب) تشدق الجذور
  - ج) تكون جذور رفيعة وطويلة
  - د) تكون جذور متفرعة
- ٣٦- تُقدّر كمية إنتاج الدونم الواحد (بالطن) عند جُنْي نباتات البقدونس في كل مرة بـ:
- أ) ١
  - ب) ٢
  - ج) ٣
  - د) ٤
- ٣٧- جميع النباتات الآتية تتنمي إلى الفصيلة النرجسية، ما عدا:
- أ) الكرات
  - ب) البروكلي
  - ج) البصل
  - د) الثوم
- ٣٨- موعد زراعة نبات الثوم مرتب بـ:
- أ) الرطوبة الجوية
  - ب) درجات الحرارة المرتفعة
  - ج) درجات الحرارة المنخفضة
  - د) طول الفترة الضوئية
- ٣٩- جميع عمليات الخدمة الآتية تُجرى لنبات الباميا بعد الزراعة، ما عدا:
- أ) الخفت والترقيع
  - ب) العرق
  - ج) الري
  - د) التربة والتلقييم
- ٤٠- المشكلة المتوقعة عند زيادة رى نبات الخس خلال مرحلة تكوين الرؤوس، هي:
- أ) تكوين سيقان قصيرة
  - ب) ضعف أوراق النبات
  - ج) ذبول الأوراق
  - د) تكوين رؤوس مفتوحة سائبة

﴿انتهت الأسئلة﴾



## امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٥

(وثيقة محمية/محلود)

مدة الامتحان: ٣٠ دس

اليوم والتاريخ: الخميس ٢٦/٦/٢٠٢٥  
رقم الجلوس:

المبحث : العلوم المهنية الخاصة/ التجميل / الورقة الأولى، ف ١  
الفرع: الاقتصاد المنزلي  
رقم المبحث: 315  
رقم النموذج: (١)  
اسم الطالب:

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلل بشكل غامقدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك، علماً أنَّ عدد الفقرات (٥٠)، وعدد الصفحات (٤).

١- المفهوم الذي يُشير إلى تغيير حالة الشعر من الأملس إلى المُموج نتيجة تعرضه للعوامل الفيزيائية، هو:

أ) التمويج المؤقت      ب) التمليس الدائم      ج) التمويج الدائم      د) التمليس المؤقت

٢- طريقة التمويج التي يكون فيها الشعر ملائصاً لفروة الرأس في أجزاء معينة تسمى (قاع الموجة)، ومرتفعاً في أجزاء أخرى تسمى (قمة الموجة)، هي:

أ) السشوار      ب) اللفافات      ج) الأصابع      د) الفير

٣- درجة الحرارة الأندى للمكواة الحرارية (الفير) تُناسب الشعر:

أ) السميك      ب) المُجعد      ج) المصبوغ      د) الأشيب

٤- مستحضرات تُستعمل لثبت شكل الموجة، وتوضع على الشعر الجاف، هي:

أ) الرغوية      ب) الرذاذية      ج) الكريمية      د) الهمامية

٥- تُعتمد عملية تمويج الشعر على:

أ) رغبة الزيون      ب) لون الشعر      ج) لمعان الشعر      د) رغبة المُزين

٦- يتَّصف الشعر الصحي بالمرونة العالية، حيث يمكن مَطْ الشَّعرة غير المُبللة بمقدار:

أ) خمس طولها      ب) ربع طولها      ج) ثُلث طولها      د) نصف طولها

٧- المفهوم الذي يُشير إلى عدد الشُّعرات في مساحة (١) سُمٌ من فروة الرأس، هو:

أ) مسامية الشعر      ب) طول الشعر      ج) صحة الشعر      د) غزارة الشعر

٨- الجهاز الذي يُستعمل في عملية التمويج الدائم للشعر ويُساعد على تسريع تفكيك الروابط الكبريتية، هو:

أ) الإشعاعي الحراري      ب) الذبذبات العالية      ج) المكواة الحرارية      د) المشط الحراري

٩- من الإرشادات المتبعة للعناية بالشعر بعد عملية التمويج الدائم للشعر:

أ) قص أطراف الشعر      ب) استعمال مشط ذي أسنان متقاربة

ج) استعمال ملطف قاعدي      د) تجيف الشعر بحرارة عالية

١٠- النتيجة السلبية المترتبة على عدم وصول محلول التمويج إلى أطراف الشعر، هي:

أ) تمويج عريض ضعيف      ب) تمويج قوي والتموجات صغيرة

ج) الشعر مموج والأطراف مستقيمة      د) تمويج غير متناسق عند الأطراف

## الصفحة الثانية

- ١١- يعود السبب في ظهور التموجات عند بل الشّعر واحتفائها بعد جفافه إلى:
- أ) استعمال لفافات صغيرة الحجم  
ب) شدّ الشعر على اللفافات  
ج) استعمال لفافات كبيرة الحجم  
د ) كسر الأطراف في أثناء عملية اللف
- ١٢- من الشروط الواجب مراعاتها عند استعمال المشط الحراري في تمليس الشعر:
- أ) استعماله للشعر الجاف  
ب) الإكثار من وضع الكريمات المكثفة  
ج) الضغط بشدة على الشعر  
د ) تنظيفه بالماء المقطّر
- ١٣- عند إجراء التمليس الدائم للشعر يجب الاهتمام بتقسيم الشعر إلى:
- أ) تسعة أقسام  
ب) ستة أقسام  
ج) أربعة أقسام  
د ) ثلاثة أقسام
- ٤- المادة الكيميائية المستعملة في عملية التمليس الدائم للشعر، وتعمل على تليين الطبقة الخارجية وتسهيل نفاذ المادة إلى لحاء الشعرة، هي:
- أ) أوكسيد الصوديوم  
ب) هيدروكسيد الأمونيوم  
ج) أوكسيد الأمونيوم
- ٥- الهدف من استعمال المادة المثبتة بعد إزالة مادة التمليس الدائم للشعر، هو:
- أ) منع تقصّف الشعر وتكسره  
ب) إعادة الروابط الكبريتية وتنظيمها  
ج) حماية فروة الرأس من التهيج
- ٦- بعد الانتهاء من التمليس الدائم، لا ضرورة لوضع الكريم الملين إذا كانت:
- أ) مادة التثبيت كريمية  
ب) نوعية الشعر جافة  
ج) مادة التمليس تركيزها قوي  
د ) حساسية الجلد عالية
- ٧- النتيجة المترتبة على استعمال مستحضر تمليس ذي تركيز خفيف، هي:
- أ) تقطع الشعر وتكسره  
ب) زوال التمليس بعد غسل الشعر  
ج) جفاف الشعر وتلفه  
د ) قلة مسامية الشعر
- ٨- من الأمور الواجب مراعاتها بعد إجراء عملية التمليس الدائم للشعر:
- أ) استعمال مثبتات قاعدية  
ب) تجنب تعريض الشعر لحمامات الزيت  
ج) استعمال شامبو ذي حموضة متوازنة  
د ) المحافظة على تعريض الشعر للرطوبة
- ٩- الدليل والمرشد لمعرفة المبادئ الأساسية للألوان، هو:
- أ) دائرة الألوان  
ب) الألوان الأساسية  
ج) الأصباغ الصناعية  
د ) الأشعة المنعكسة
- ١٠- اللون الذي يُضاف لتغيير قيمة اللون، هو:
- أ) الأسود  
ب) الأبيض  
ج) الأزرق  
د ) الرمادي
- ١١- المفهوم الذي يشير إلى إلغاء أو تخفيف التأثير من شدة اللون الناتج من الألوان الاصطناعية، هو:
- أ) تحديد الألوان  
ب) كثافة الألوان  
ج) قيمة الألوان  
د ) شدة الألوان

### الصفحة الثالثة

٢٢- الأصباغ النباتية التي تستعمل بعَرَض إزالة الاصفار من لون الشُّعر وإعطاء اللون الرمادي، هي:

- أ) الجوز      ب) البابونج      ج) النيلة      د) الحناء

٢٣- الأصباغ الصناعية ذات الجزيئات الكبيرة نسبياً التي تكون غير قادرة على الدخول إلى الطبقة الوسطى من الشعرة هي:

- أ) المؤقتة      ب) نصف الدائمة      ج) الدائمة      د) الحمضية

٢٤- العنصر الذي يدخل في تركيب الأصباغ الدائمة، ويعمل على تخفيف سرعة أكسدة المواد الملونة مع الماء الأكسجيني، هو:

- أ) المليّنات      ب) هيدروكسيد الأمونيوم      ج) الرغوي      د) سلفات الصوديوم

٢٥- من خصائص الماء الأكسجيني أنه:

- أ) لا يتأثر بالحرارة      ب) صعب التأكسد      ج) سهل التحلل      د) لا يتأثر بالضوء

٢٦- نسبة الماء الأكسجيني الأعلى تركيزاً في صالونات التجميل، ويتسبب في تلف الشعر وجفافه، ويمكن تخفيفه بإضافة الماء المقطّر، هي:

- أ) %٩      ب) %١٢      ج) %١٨      د) %٢٤

٢٧- إذا علمت أن تركيز الماء الأكسجيني التقليدي هو (٦)%؛ فإنه يعادل بالوحدة الحجمية:

- أ) ٢٠ فوليوم      ب) ٤٠ فوليوم      ج) ٦٠ فوليوم      د) ٨٠ فوليوم

٢٨- إذا أردنا استعمال أنبوب صبغة وزنه (٦٠) غم، ونسبة خلط الصبغة مع الماء الأكسجيني (٣+١)؛ فإن كمية الماء الأكسجيني اللازمة تكون:

- أ) ٦ سم<sup>٣</sup>      ب) ١٢٠ سم<sup>٣</sup>      ج) ١٨٠ سم<sup>٣</sup>      د) ٢٤٠ سم<sup>٣</sup>

٢٩- الجزء الذي يوضع الصباغ عليه عند إجراء فحص الحساسية هو:

- أ) باطن المرفق وخلف الأذن      ب) خلف الرقبة والكوع

- ج) مقدمة الرأس      د) ظاهر الرسغ

٣٠- الألوان التي يستعملها المُرْيِن بِنِسَبَ قليلة لتحييد الألوان غير المرغوبة والظاهرة على الشعر، هي:

- أ) الأساسية      ب) الخلط      ج) المركبة      د) الثانوية

٣١- اللون المركب الذي يستعمل لظهور الشعر بالألوان الصفراء، هو:

- أ) الأخضر      ب) البنفسجي      ج) الأحمر      د) البرتقالي

٣٢- يعتمد لون الشعر الطبيعي على نسبة وتركيز صبغة:

- أ) الكيراتين      ب) اللانولين      ج) الكولاجين      د) الميلانين

٣٣- ترغب زبونة ذات شعر بُنيٌّ متوسط (٤/٠) في تفتيح لونه ليصبح بُنياً فاتحاً (٥/٠)؛ فإن الإجراء الصحيح هو صبغ الشعر باللون:

- أ) الأشقر الغامق (٦/٠)

- ج) الأشقر الفاتح (٨/٠)

- ب) البُني الفاتح (٥/٠)

- د) أشقر متوسط (٧/٠)

## الصفحة الرابعة

٣٤- عند تفتيح اللون الطبيعي للشعر توضع الصباغ على طول **خصل الشعر**، مبتعدين عن فروة الرأس من جهة الرقبة مسافة:

- (أ) ١ سم      (ب) ٢ سم      (ج) ٣ سم      (د) ٤ سم

٣٥- نبدأ بوضع الصباغ عند وجود الشيب في الشعر على منطقة:

- (أ) جذور الشعر      (ب) أطراف الشعر      (ج) أسفل الرأس      (د) الشيب الكثيف

٣٦- للمساعدة على عدم تغيير درجة حموضة مواد تفتيح الشعر يُنصح بإضافة:

- (أ) المواد الحافظة      (ب) كربونات المغنيسيوم      (ج) الأكسيد      (د) مركب الأمونيوم

٣٧- يُنصح بعدم استعمال مزيل لون الشعر الهلامي عند إجراء الميش للشعر؛ وذلك لأنّه:

- (أ) يفتح جذور الشعر بسرعة      (ب) يفقد فعاليته فور وضعه

- (ج) يسهل نفاذه من ثقوب الطاقية      (د) يُعطي مفعول صباغ الشعر

٣٨- إحدى الأسباب التي تؤدي إلى تلف الشعر نتيجة عملية إزالة لون الشعر، هي:

- (أ) زيادة مدة إزالة اللون      (ب) استعمال ماء أكسجيني بتركيز خفيف

- (ج) وضع مزيل اللون على الشعر البكر      (د) غسل الشعر بشامبو حامضي

٣٩- من الأدوات المستعملة في عملية التفتيح الجزئي للشعر، ورق:

- (أ) الزبدة      (ب) القصدير      (ج) مقوّى      (د) الطرف

٤٠- من المشكلات التي تواجه المُزّين عند إزالة لون الشعر مقاومة وثبات اللون:

- (أ) البُني المُحمر      (ب) الأبيض المُصفر      (ج) البُني الغامق      (د) الأصفر المُحمر

• ضع إشارة (✓) أمام العبارة الصحيحة، وإشارة (✗) أمام العبارة الخطأ، ثم ظلّ بشكّل عامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (الدائرة ذات الرمز (أ) للتعبير عن الصواب والدائرة ذات الرمز (ب) للتعبير عن الخطأ):

٤١- ( ) تُنظف المكواة الحرارية بمسحها بمحلول كحولي تركيزه (٧٠%).

٤٢- ( ) الجل والواكس من مستحضرات التبييض الرغوية.

٤٣- ( ) يفضل تأجيل عملية التمويging في حالة الحمل بالشهرين الأخيرين.

٤٤- ( ) يجب مراعاة عدم تمشيط خصلة الشعر قبل لفّها عند إجراء التمويging الدائم.

٤٥- ( ) يفضل تمليس الشعر تمليساً مؤقتاً بالمشط الحراري في حالة الشعر الخشن السميكي.

٤٦- ( ) يفضل عند استعمال مادة هيدروكسيد الصوديوم في التمليس الدائم أن يكون الشعر نظيفاً وغير رطب.

٤٧- ( ) يُستعمل الكريم الواقي لحماية فروة الرأس في أثناء عملية التمليس.

٤٨- ( ) تُعطى الأصباغ المعدنية مظهراً صحيحاً ولاماً للشعر.

٤٩- ( ) من أسباب فشل الصبغة خلط الصبغة بالماء الأكسجيني، وعدم وضعها مباشرة على الشعر.

٥٠- ( ) يجب الحذر عند إجراء عملية الميش في حالة الشعر المُملس؛ لأنّ الشعر يكون أقلّ مسامية.



## امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٥

(وثيقة محمية/محدود)

المبحث : العلوم المهنية الخاصة/التصنيع الغذائي المنزلي/الورقة الأولى، ف ١  
مدة الامتحان: ٣٠ د س  
الفرع: الاقتصاد المنزلي  
اليوم والتاريخ: الخميس ٢٠٢٥/٦/٢٦  
رقم المبحث: 301  
رقم النموذج: (١)  
اسم الطالب:

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلل بشكل غامقدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك، علماً أن عدد الفقرات (٥٠)، وعدد الصفحات (٤).

١- المكون الذي يشكل الجزء الرئيس من المواد الصلبة في الخضروات والفواكه وتتراوح نسبته بين (٣٠ - ٢٠) %

من وزنها، هو :

- |  |                   |   |                                     |
|--|-------------------|---|-------------------------------------|
| د) الحموض العضوية  | ج) الكربوهيدرات   | ب) البروتينات                               | أ) الماء                            |
| ٢- الشكل الذي يتحول له البكتيريا عندما تصبح الثمار ناضجة جداً وقريبة من مرحلة الشيخوخة:                |                   |   |                                     |
| د) اللجنين   | ج) الأليبيدو      | ب) حمض البكتيريك                            | أ) البروتوبكتين                     |
| ٣- الصبغة القابلة للذوبان في الماء، وتوجد في فجوة الخلية العصارية:                                     |                   |   |                                     |
| د) الكلوروفيل  | ج) الأنثوسانيين   | ب) الكاروتين                                | أ) اللايكوبين                       |
| ٤- أحد مكونات الخضروات والفواكه الذي يحافظ على اللون بمئع الاسمرار الإنزيمي:                           |                   |   |                                     |
| د) الحموض العضوية  | ج) البروتينات     | ب) الدهون                                   | أ) الإنزيمات                        |
| ٥- المواد القابضة التي تقل نسبتها في ثمار البح والتفاح كلما زاد نضجها:                                 |                   |   |                                     |
| د) حمض البكتيريك   | ج) الإنزيمات      | ب) التانينات                                | أ) البروتوبكتين                     |
| ٦- يُعد وجود إنزيم الكاتاليز في الخضروات والفواكه دليلاً على:  |                   |   |                                     |
| أ) حدوث الاسمرار الإنزيمي في الثمار  |                   |   |                                     |
| ب) عدم كفاية عمليات السلق الخفيف في الخضروات والفواكه  | ج) الألغان        | د) تكون الألغان داخل ثمار الخضروات والفواكه | ج) عدم إتمام نضوج الخضروات والفواكه |
| ٧- يصنف البقطين واللفل الأحمر حسب جزء النبات المأخوذ منه إلى:  |                   |   |                                     |
| د) أبصال   | ج) درنات          | ب) جذور                                     | أ) ثمار                             |
| ٨- العائلة التي تتبع لها ثمار الإجاص:  |                   |   |                                     |
| د) اللوزيات  | ج) الفراخيات      | ب) القرعيات                                 | أ) الحمضيات                         |
| ٩- الفواكه عديدة البذور التي تتضخم خلال فصل الخريف والشتاء، وستعمل قشورها في صناعة البكتيريا ومنتجاته: |                   |   |                                     |
| د) البطيخ والشمام  | ج) الخوخ والممشمش | ب) الإجاص والسفرجل                          | أ) الليمون والبرتقال                |
| ١٠- الفاكهة التي تستخدم ثمارها في إنتاج الخل والعصير والمربىات:  |                   |   |                                     |
| د) العنبر  | ج) الموز          | ب) السفرجل                                  | أ) الشمام                           |
| ١١- المادة الناتجة عن عملية التنفس اللاهوائي في الثمار بسبب تحلل المركبات العضوية:                     |                   |   |                                     |
| د) الماء   | ج) الأكسجين       | ب) الكحول                                   | أ) الجلوكوز                         |
- يتبع الصفحة الثانية ....

## الصفحة الثانية

١٢ - أولى دلالات النضج في معظم أنواع الثمار هي:

ب) تكون التانينات

أ) اختفاء اللون الأخضر

د) زيادة كمية الدهون

ج) بناء النشا

١٣ - تؤدي زيادة درجة حرارة المخزن في أثناء حُرْنَ الخضراوات والفاكه إلى:

ب) اكتمال تكون الطبقة الشمعية على الثمار

أ) طول مدة تخزين الثمار

د) تقليل عملية النتح

ج) زيادة سرعة التنفس

٤ - السبب في مراعاة شراء الخضراوات والفاكه بكميات مناسبة بحيث تستهلك خلال فترة قصيرة:

ب) انخفاض نسبة الصبغات في الثمار

أ) انخفاض نسبة المواد الطيارة في الثمار

د) سرعة تأف الثمار وقلة جودتها مع طول فترة التخزين

ج) احتواء الثمار على كميات عالية من الجينين

٥ - درجة الحرارة التي تتعرض الثمار دونها إلى تغيرات سلبية في صفاتها وتركيبها تُعرف بـ:

د) حرارة السُّلُقُ الخيفي

أ) الحرارة الحرجة للحفظ المُبرد

ج) حرارة التخزين المختلط

ب) حرارة التعينة

٦ - تتراوح نسبة الرطوبة عند تخزين البصل والثوم بين:

أ) (٩٥-٩٠)%

ب) (٨٥-٨٠)%

ج) (٧٠-٦٥)%

٧ - نظام التبريد الذي يعتمد على استعمال الحرارة الكامنة للسوائل المتطايرة التي تمتص عند تبخيرها جزءاً من حرارة

الهواء المحيط، هو التبريد:

د) الجاف

ج) المضبوط

ب) الصناعي

أ) الطبيعي

٨ - تهدف عملية السُّلُقُ الخيفي للخضراوات قبل تجفيفها إلى:

أ) تغيير اللون الأخضر للخضراوات إلى اللون الزيتوني الباهت

ب) زيادة الأكسجين الذائب في الأنسجة النباتية

ج) زيادة التفاعلات الحيوية في أنسجة الثمار

د) القضاء التام على الإنزيمات الضارة

٩ - يُسَبِّب سوء تغليف الخضراوات المُجمدة:

أ) جفاف سطح الخضراوات

ب) اسمرار لون الخضراوات

ج) وجود بلورات ثلوجية على الخضراوات

د) تقليل مدة طهو الخضراوات

١٠ - الخضراوات التي تُجفَّ في الظل:

أ) الزهرة

ب) البندرة

ج) الخضروات الورقية

د) الفاصولياء

١١ - المعاملة التي تسبق عملية التجفيف وتهدف إلى إزالة الطبقة الشمعية المُغطّأ بها ثمار الفاكهة:

د) الكبريتة

أ) الغمر في المحاليل القلوية

ج) التركيز بالتجفيف

١٢ - يزداد معدل التجفيف زيادة نسبية ثابتة عند:

أ) زيادة حركة الهواء وارتفاع رطوبته النسبية

ب) زياة حركة الهواء وانخفاض رطوبته النسبية

ج) نقصان حركة الهواء وارتفاع رطوبته النسبية

د) نقصان حركة الهواء وانخفاض رطوبته النسبية

١٣ - من مزايا طرائق التجفيف الصناعي:

أ) سهلة وغير مُكلفة

ب) لا تحتاج إلى خبرة عالية

ج) لا تحتاج إلى أجهزة ومعدات

د) إمكانية التحكم بدرجة الحرارة

### الصفحة الثالثة

٤- يؤدي تكُون الوسط الحمضي في عملية التخمر اللاكتيكي إلى:

- ب) تثبيط الإنزيمات المسئولة للتخمر
- د ) إكساب نكهات غير مرغوب فيها

أ) نشاط أنواع من الأحياء الدقيقة المسئولة للتخمر

ج) اهتراء المخللات وتعفنها

٥- السبب في لزوجة سطح المخلل وهلاميته:

- ب) زيادة تركيز المحلول الملحي أكثر من (١٠)%
- د ) نشاط الإنزيمات المُحللة للبكتيريا

أ) التخليل على درجة حرارة (٣٠-٢٥)° س

ج) توزُّع طبقة الخمائر السطحية في المحلول

٦- الهدف من إضافة قليل من محلول تخليل ناجح وطازج في أثناء تصنيع المخلل:

- ب) مَنْع انكماش المخلل

أ) السماح بخروج الغازات المُتكونة في بداية التخليل

- د ) الحدّ من نموّ الخمائر والأعفان على سطح المخلل

ج) الإسراع في عملية التخليل

٧- المشكلة التي تظهر في حالة استعمال خضراوات غير ملائمة من حيث الصنف أو درجة النضج أو الجودة عند إعداد المخللات:

- ب) طعم غير مقبول ورائحة كريهة

أ) لزوجة سطح المخلل

- د ) انكمash المخلل

ج) تكون طبقة بيضاء على سطح المخلل

٨- يتحوّل السكر عند تسخينه مع خليط الفواكه أو عصيرها بوجود الحمض إلى سكر:

- د) مُتبولور

- ج) هلامي

- ب) مُنْقَلِب

أ) مُتَكَرِّل

٩- للحصول على أكبر كمية من البكتيريا اللازم لتكوين الهلام عند إعداد المربى تستعمل الفاكهة:

- د ) شديدة النضج

- ب) قليلة النضج

أ) غير الناضجة

- ج) تامة النضج

١٠- تساعد عملية طبخ المربى على:

- ب) تحويل السكر إلى سكر مُتبولور

أ) المحافظة على السكر خارج أنسجة الثمار

- د ) القضاء على الميكروبات والإنزيمات الضارة

ج) حفظ تركيز المزيج من خلال حفظ تبخّر الماء

١١- يتمثل الفحص الحسي الذي يمكن اعتماده لتحديد مستوى تضoj المربيات بـ:

أ) اختبار لزوجة المنتج بحيث يكون هلاميًّا لزجاً بعد تبريدـه      ب) مشاهدة تساقط المنتج على شكل خيط متصل

ج) زيادة تكون الريم على سطح المربى      د) قياس تركيز المواد الصلبة باستخدام المكثاف

١٢- من الإجراءات الصحيحة عند التعبئة الساخنة للمربيات:

أ) تعبئة المربى ساخناً (١٠٠)° س في عبوات زجاجية مناسبة

ب) ملء المرطبات حتى الحافة مع التخلص من فقاعات الهواء

ج) إغلاق المرطبات بشكل شبه محكم للمساعدة في خروج الغازات

د) قلب المرطبات بعد تغطيتها لمدة (٣٠) دقيقة لتعقيم الغطاء

١٣- السبب في ظهور عيب صلابة قطع الفاكهة وتكرمشها عند إعداد المربى:

- ب) سلق الفاكهة في ماء شديد العسرة

أ) مدة الطبخ قصيرة

- د ) درجة حرارة التعبئة الساخنة غير كافية

ج) الفاكهة فقيرة بالبكتيريا

١٤- التبخير المناسب لتفادي مشكلة نموّ الأعفان على سطح المربى:

- ب) سلق الفاكهة قبل إضافة السكر

أ) اختيار الفاكهة تامة النضج

- د ) إضافة بكتيريا صناعي في أثناء طهـو المربى

ج) طبخ المربى لمدة كافية

يتابع الصفحة الرابعة ....

## الصفحة الرابعة

- ٣٥- المنتج الذي يتصرف بالقوام المتماسك ويأخذ شكل الآنية المعبأ فيها بعد إزالته منها:
- أ) المربى      ب) الفاكهة المسكرّة      ج) المرملاد      د) الجلي
- ٣٦- المشكلة التي يمكن تدبيرها بزيادة نسبة البكتيريا عند إعداد الجلي:
- أ) الهمام القوي      ب) التسكيير      ج) الطعام المُتكمّل      د) سيولة الجلي
- ٣٧- الهدف من انتخاب ثمار الفاكهة الطريقة بعد اكتمال نضجها عند إعداد شراب الفاكهة هو الحصول على:
- أ) أفضل نكهة وأقل نسبة بكتيريا      ب) أعلى نسبة بكتيريا وعصير عالي اللزوجة      ج) أقل نكهة وأعلى نسبة بكتيريا
- ٣٨- السبب في ظهور النكهة الضعيفة في شراب الفاكهة:
- أ) كمية السكر قليلة      ب) التعبئة الباردة      ج) المعاملة الحرارية الشديدة      د) استعمال عبوات زجاجية عند التعبئة
- ٣٩- من مواصفات شراب الفاكهة عالي الجودة:
- أ) احتواؤه على بذور الفاكهة المصنوع منها وقشورها      ب) احتواؤه على الطعم اللاذع الناتج من عصر القشور      ج) تجاص قوامه ووضوح طعمه ورائحته ولون الفاكهة المصنوع منها      د) تركيز السكر فيه لا يقل عن ٢٥%
- ٤٠- التدبير المناسب لنمو الخمائير على سطح شراب الفاكهة:
- أ) التعبئة الساخنة      ب) استعمال فاكهة غير تمام النضج      ج) استعمال فاكهة غنية بالبكتيريا
- ضع إشارة (✓) أمام العبارة الصحيحة، وإشارة (✗) أمام العبارة الخطأ، ثم ظلّ بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (الدائرة ذات الرمز (أ) للتعبير عن الصواب والدائرة ذات الرمز (ب) للتعبير عن الخطأ):
- ٤١- ( ) تقطّف ثمار الموز قبل تمام نضجها، وتُخزن في غرف باردة ومضبوطة لإنضاجها.
- ٤٢- ( ) يستخدم غاز الإيثيلين في المخازن في إنضاج الحمضيات.
- ٤٣- ( ) اللجنين مادة كريوهيدراتية لا تتأثر بالحرارة.
- ٤٤- ( ) الأغذية المبردة هي تلك الأغذية المخزنة على درجة حرارة أعلى من تجمد الماء في الغذاء.
- ٤٥- ( ) يُعد التركيز مرحلة من مراحل تجفيف الأغذية السائلة.
- ٤٦- ( ) يحدث فقد كبير لمعظم العناصر الغذائية الموجودة في الخضراوات في أثناء الحفظ بالتخزين.
- ٤٧- ( ) يُعد التوازن بين الحمض والسكر ضروريًا للحصول على طعم ممیز ولزوجة منخفضة في إنتاج الثمار المحفوظة بالسكر.
- ٤٨- ( ) عند إعداد المرملاد تقطع قشور ثمار الحمضيات إلى قطع صغيرة، ثم تُسلق للتخلص من جزء من مراتتها.
- ٤٩- ( ) يُضاف السكر بنسبة (٢:١) للعصير الرائق عند إعداد الجلي.
- ٥٠- ( ) الفاكهة المسكرّة هي فاكهة كاملة أو مقطعة مطهوة بالسكر، وهي شبه جافة قابلة للحفظ.

»انتهت الأسئلة«



## امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٥

(وثيقة محمية/محلوٰد)

مدة الامتحان: ٣٠ د س  
اليوم والتاريخ: الخميس ٢٠٢٥/٦/٢٦  
رقم الجلوس:

المبحث : العلوم المهنية الخاصة/انتاج الملابس/الورقة الأولى، ف ١  
الفرع: الاقتصاد المنزلي  
اسم الطالب:

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلل بشكل غامقدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك، علمًا أن عدد الفقرات (٥٠)، وعدد الصفحات (٤).

١- تُعبر الخطوط المستقيمة والمائلة والمُحنّنة في رسم المُخطّطات عن:

- ب) الصورة الظلّية للجسم
- د) أشكال أجزاء الجسم
- أ) أبعاد الجسم وقياساته
- ج) النسبة الذهبية للجسم

٢- جُزء الجسم البشري الذي يمكن أن يتّخذ الشكل الأحذب، هو:

- د) الجزء
- ج) الظهر
- ب) الذراع
- أ) الكتف

٣- الذراع التحيف أحد أشكال الذراع لجسم الإنسان، ويمكن تمييزه بأنه ذو عظم:

- د) مُمثٰى
- ج) مجوف
- ب) واضح
- أ) مَخْفيٰ

٤- يُعد وضع الذراع على جانب الجسم خطًّا للاتزان الذي يعتمد عليه في تحديد:

- ب) محيط الخصر
- د) شكل الجزء المثالي
- ج) طول الجسم
- أ) شكل انتساب القامة

٥- المقاس الذي يعتمد عليه عند اختيار المقاس المعياري لرسم المُخطّط الأساسي لجزء العلوي الأقرب لمقاس

الشخصي، هو:

- د) طول الخصر
- ج) محيط الصدر
- ب) محيط الحوض
- أ) عرض الظهر

٦- الخط الذي يعدل مكانه بإضافة (١) سم للأمام وحذف (١) سم من الخلف عند رسم المُخطّط الأساسي لجزء العلوي

للجسم، ليحرف قليلاً إلى جهة الخلف، هو:

- د) مُنتصف الأمام
- ج) الحوض
- ب) الجانب
- أ) مُنتصف الخلف

٧- تُحدّد مسافة خياطة خطًّا كتف البلوزة بمقدار:

- د) (٤) سم
- ج) (٣) سم
- ب) (٢) سم
- أ) (١) سم

٨- الدرزة التي تُثَقَّد على خطًّا الجانب الذي فيه انحاء في قطعة الملابس، هي:

- د) المدعّمة
- ج) المُتقابلة
- ب) المركبة
- أ) الباصّة

٩- طريقة تحوير بنية الصدر التي تساعد في استعمال المُخطّط الأساسي مرات عدّة دون أن يتّلف، هي:

- د) الطباعة
- ج) الشفّ
- ب) القصّ
- أ) التدوير

## الصفحة الثانية

- ١٠- يعتمد تصثير طول بنسبة تحت الإبط على بروز الصدر وامتلائه، حيث يكون بمقدار (٥) سم في حال الصدر:  
أ) الصغير      ب) المعياري المتوسط      ج) الكبير
- ١١- من الأمور الواجب مراعاتها عند قص مخطط بنسبة الصدر المحورة إلى غبنة في خط الخصر:  
ب) تعديل مكان خط الجنب      ج) تثبيت البنسة بعد قص المخطط  
د) رسم خط الخصر بخط مُنْحِنٍ
- ١٢- مخطط الجزء العلوي الذي حُورّت بنسبة الصدر فيه إلى كلوش في خط الخصر، يمكن استخدامه لتحويل بنسبة الكلوش المحورة إلى:  
أ) درابييه      ب) روية      ج) زم
- ١٣- الجزء في المخطط الذي تنقل علامات خياطته إلى القماش باستعمال غرزة الباسنة، هو:  
أ) مسافة الزم      ب) طول العروة      ج) نقطة نهاية البنسة
- ٤- تتوجه عملية خياطة البنسة وإغلاقها عادة في المخططات نحو المنطقة الأعرض، اعتماداً على:  
أ) نقطة مُنتصف البنسة      ب) عمق البنسة      ج) طول البنسة
- ١٥- الهدف من تفريغ البنسة على خطّي رسماها عند خياطتها في حشوة المعطف، هو:  
أ) الحد من تسيل القماش      ب) تسهيل تركيب البطانة  
ج) إزالة السمك في طبقات الحشوة
- ٦- شكل الزم الذي ينفّذ بعمل درزة بين علامتي الاتزان، هو التثبيت:  
أ) البسيط      ب) المتوسط      ج) الكثيف
- ١٧- الإجراء المتبّع عند رسم القصة الطولية (البرنس) بعيدة عن نقطة الصدر، هو:  
أ) تحويل بنسني الصدر والخصر معًا إلى خط الجنب      ب) تحويل بقية بنسبة الصدر باتجاه بنسبة تحت الإبط  
ج) زيادة طول بنسبة الخصر في الأمام
- ٨- قصّة الروبة المستقيمة التي لا تظهر فيها بنسبة الصدر ثرّس بحيث تمرّ:  
أ) بأي نقطة على حفرة الرقبة      ب) بأي نقطة على خط الكتف  
ج) في رأس البنسة
- ١٩- التصميم الذي يتطلّب تفزيذ عملية القصقصة والتثليم في مسافة خياطة بعض خطوطه، هو:  
أ) تورة قصيرة دبل كلوش      ب) قميص بكّم زم من الأعلى  
ج) فستان برنس طويل
- ٢٠- من الأدوات المستخدمة عند كيّ القصّات المُنْحِنَة في قطعة الملابس:  
أ) أشرطة من الكرتون      ب) المسطرة الفرنسية      ج) لوحة إبرية
- ٢١- ثرّس بنسبة صغيرة على خط حفرة الرقبة الواسعة بعيدة عن الجسم لإغلاقها وتحويلها إلى بنسبة الصدر، أو تشرّب عند تركيب:  
أ) الأزرار      ب) السجاف      ج) المرد

### الصفحة الثالثة

٢٢- يبدأ رسم حفرة الرقبة الدائرية بخطٍ مُنْحَنٍ بحيث يكون عاموبياً على خطٍ مُنْتَصِفِ الأَمَامِ؛ وذلك لإعطائِها:

- أ) الاتساع      ب) الاستدارة      ج) الارتفاع      د) الانسدال

٢٣- يُستعمل السجاف لتنظيف الفتحات والحرفات، بحيث يُرسَم حسب تصميم حفرة الرقبة تماماً، ويترافق عرضه من:

- أ) (٦٠-٦١) سم      ب) (٦٣-٦٧) سم      ج) (١١٠-١٢٠) سم      د) (٩٠-١٤٠) سم

٢٤- عند انتباق الحافة الداخلية للحشوة على خطٍ ثني السجاف المُمتد، ثبّت الحشوة بغرزة:

- أ) السلسلة      ب) الباصنة      ج) اللقطة      د) البطانية

٢٥- عند تنفيذ الدرزة المُدعَّمة على خطٍ خياطة سجاف الحفرة، تقصّ بعض خيوط الدرزة على أبعاد مُحدَّدة إذا كان السجاف:

- أ) مطابقاً للحفرة      ب) أصغر من الحفرة      ج) موازيًّا للمرد

٢٦- الأقمشة المناسبة لتنفيذ السجاف على شكل طوق، هي:

- أ) الجلدية      ب) الكتانية      ج) الإسفنجية      د) المطاطية

٢٧- في قطعة الملابس ذات البِيَافِق المفتوحة يصل عَرَض بطانة المرد العادي إلى خطٍ:

- أ) الجنب      ب) حفرة الإبط      ج) مُنْتَصِفُ الْخَلْفِ

٢٨- عند رسم المرد ذي الصفيّن من الأزرار يكون خطٍ مُنْتَصِفِ الأَمَامِ لقطعة الملابس:

- أ) في مُنْتَصِفِ المسافة بين خطٍي الأزرار      ب) في مُنْتَصِفِ عَرَضِ المرد النهائِي

- ج) موازيًّا لحفرة الإبط      د) موازيًّا لخطٍ الصدر

٢٩- من الأمور الواجب مراعاتها عند تنفيذ التصميم غير المتماثلة:

- أ) قص المُخْطَط على طبقة واحدة من القماش

- ج) وضع المُخْطَط على الوجه الخلفي للقماش

٣٠- يُعَيَّن مكان العروة في الملابس نوات القلب على مستوى نقطة:

- أ) بنسبة الخصر      ب) ثني القلب      ج) بُروزِ الحوض      د) نهاية المرد

٣١- تشكّل المسافة بين خطٍ ثني البِيَافِق وخطها الخارجي ما يُسمى بـ:

- أ) عَرَضِ البِيَافِق      ب) ارتفاعِ البِيَافِق      ج) طولِ البِيَافِق

٣٢- خطٍّ البِيَافِق الذي يمكن زيادة طوله بعمل شقوق فيه لتأخذ البِيَافِق الشكل المُنسَدِلُ، هو:

- أ) الداخلي      ب) الالتفاف      ج) الخارجي      د) التركيب

٣٣- يوضع خطٌ الكتف (الأمامي والخلفي) معًا عند نقطة الرقبة عند رسم مُخْطَطِ بِيَافِقَةِ:

- أ) القميص      ب) السبور      ج) العسكرية المُتَصلَّة      د) المسطحة البَيْبِي

٣٤- البِيَافِق التي تتميّز بأن لها قطعة على شكل مُثُلث مقلوب لتغطية جزء من حفرة الرقبة الواسعة، هي:

- أ) البحريَّة      ب) العسكرية      ج) القميص      د) البَيْبِي

٣٥- توضع الحشوة على الطبقة العُلَيَا للبِيَافِق في الأقمشة الشفافة؛ وذلك لـ:

- أ) إعطاء ملمس ناعم      ب) زيادة عَرَضِ البِيَافِق

- ج) منع ظهور الخياطات      د) تقليل سماكة القماش

## الصفحة الرابعة

٣٦ - (الريفيير) هو الاسم الذي يُطلق على البالاقي:

د) العسكرية

ج) البحريّة

ب) الشال

أ) القلّاب

٣٧ - الإجراء المُتبَع لتفويية البالاقي الشال عند تنفيذها في قطعة الملابس، هو:

ب) تركيب حشوة غير لاصقة

أ) قصّها بثلاث طبقات

د) تثبيتها بغرزة السراحة المزدوجة

ج) تنفيذ غبنة على خط التركيب

٣٨ - تحدّد مسافة خياطة بمقدار (١,٥) سم في مُخطّط الكُم حول خط:

د) الكوع

ج) نهاية الطول

ب) الجنب

أ) دوران حَفْرَةِ الكُم

٣٩ - يتحدد طول الإسورة المستقيمة المُعلقة للكُم، وفقاً للمعادلة:

ب) محيط الرسغ + ٥ سم

أ) محيط الرسغ - ٥ سم

د) محيط الذراع + ٥ سم

ج) محيط الذراع - ٥ سم

٤٠ - أهم ما يميّز كُم البالون وجود:

ب) زم في الأعلى والأسفل

أ) بنسة على خط المرفق

د) تشريب على خط الكوع

ج) وَصْنَلَة خشنة عند حَفْرَةِ الإبط

● ضع إشارة (✓) أمام العبارة الصحيحة، وإشارة (✗) أمام العبارة الخطأ، ثم ظلل بشكل عامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (الدائرة ذات الرمز أ) للتعبير عن الصواب والدائرة ذات الرمز (ب) للتعبير عن الخطأ):

٤١ - ( ) يجب أن يتساوى مقدار توسيع حَفْرَةِ الرقبة على خط الكتف لكل من الأمام والخلف.

٤٢ - ( ) يختلف اتساع حَفْرَةِ الرقبة المُرْبَعَة حسب طول نقطة نهايتها (عمقها) على خط الخصر.

٤٣ - ( ) يمكن قص السجاف المماثل لشكل حَفْرَةِ الرقبة من قماش قطعة الملابس ذاتها.

٤٤ - ( ) يُرسَم مُخطّط حشوة البالاقي باستخدام مُخطّط السجاف بعد حذف (١) سم من حافته الخارجية.

٤٥ - ( ) تُنظف حافّة سجاف الأقمشة الرقيقة بغرزة الباسنة.

٤٦ - ( ) يُحدّد طول المرد العادي للقميص باستخدام قانون (نصف قطر الزر + ١ سم).

٤٧ - ( ) يُراعي عند اختيار شكل البالاقي وتصميمها أن يتاسب مع شكل الوجه والرقبة.

٤٨ - ( ) تتميّز البالاقي الشال بأن لها طوقاً مُرتفعاً حول الرقبة بعروة وزر.

٤٩ - ( ) تُقصّ البالاقي العالية المستقيمة من قطعة واحدة من القماش أو قطعتين.

٥٠ - ( ) يصنّف كُم الوطواط من الأكمام المُفصّلة.

﴿انتهت الأسئلة﴾