



امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٥

(وثيقة محمية/محدود)

س د

مدة الامتحان: ٣٠ : ٢

اليوم والتاريخ: الأحد ٢٠٢٥/٠٦/٢٩
رقم الجلوس:

رقم المبحث: 105

رقم النموذج: (١)

المبحث: الرياضيات (الورقة الثانية، ف ٢)

الفرع: العلمي + الصناعي جامعات

اسم الطالب:

ملحوظة مهمة: أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (5)؛ بحيث تكون إجابتك عن السؤال الأول على نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي)، وتكون إجابتك عن باقي الأسئلة على دفتر الإجابة، علماً أن عدد صفحات الامتحان (8).

السؤال الأول: (100 علامة)

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلّل بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك في هذا السؤال، علماً أن عدد فقراته (25)، وانتبه عند تظليل إجابتك أن رمز الإجابة (a) على ورقة الأسئلة يقابله (أ) على ورقة القارئ الضوئي، و (b) يقابله (ب)، و (c) يقابله (ج)، و (d) يقابله (د).

(1) ناتج: $\int \frac{\cos x \cos 3x}{\cos 2x + \cos 4x} dx$ هو:

- a) $-\frac{1}{2}x + C$
- b) $\frac{1}{2}x + C$
- c) $-x + C$
- d) $x + C$


(2) ناتج: $\int \frac{x^2+2x+2}{x+2} dx$ هو:

- a) $\frac{x^2}{2} + 2 \ln|x+2| + C$
- b) $\frac{x^2}{2} - 2 \ln|x+2| + C$
- c) $x^2 + 2 \ln|x+2| + C$
- d) $x^2 - 2 \ln|x+2| + C$

(3) إذا كان الاقتران المبيّن مُنحناه في الشكل الآتي هو: $f(x) = 5 - 5^x$ ، فإنّ مساحة المنطقة المظلّلة بالوحدات

المربعة هي:

- a) $\frac{1}{\ln 5}$
- b) $\frac{9}{\ln 5}$
- c) $5 - \frac{6}{\ln 5}$
- d) $5 - \frac{4}{\ln 5}$



يتبع الصفحة الثانية ،،،

الصفحة الثانية/نموذج (١)

(4) إذا كان: $\int_a^{2a} \left(\frac{x+1}{x}\right) dx = \ln 6, a > 0$ فإن قيمة الثابت a هي:

- a) $\frac{\ln 4}{3}$
- b) $\ln 4$
- c) $\frac{\ln 3}{3}$
- d) $\ln 3$

(5) قيمة: $\int_0^2 \left(\frac{e}{2}\right)^{2-x} dx$ هي:

- a) $\frac{4-e^2}{4\ln 2 - 4}$
- b) $\frac{e^2-4}{4\ln 2 - 4}$
- c) $\frac{4+e^2}{\ln 2 + 4}$
- d) $\frac{4+e^2}{\ln 2 - 1}$

(6) قيمة: $\int_{-1}^0 \sqrt{x^2 - x^4} dx$ هي:

- a) -1
- b) 1
- c) $\frac{1}{3}$
- d) $-\frac{1}{3}$

(7) قيمة: $\int_{-2}^0 e^{6x} \left(2 - \frac{2}{e^x}\right)^5 dx$ هي:

- a) $-\frac{16}{3} \left(\frac{1}{e^2} - 1\right)^6$
- b) $-\frac{16}{3} \left(1 - \frac{1}{e^2}\right)^5$
- c) $\frac{16}{3} \left(\frac{1}{e^2} - 1\right)^6$
- d) $\frac{16}{3} \left(1 - \frac{1}{e^2}\right)^5$

الصفحة الثالثة/نموذج (١)

(8) يُمثّل الاقتران $P(x)$ سعر القطعة الواحدة (بالدينار) من مُنتَج معيّن، حيث x عدد القطع المباعة بالمئات.

إذا كان: $P'(x) = \frac{-6x}{\sqrt{8+x^2}}$ هو معدل التغيّر في سعر هذه القطعة، وكان سعر القطعة الواحدة هو JD 10،

عندما يكون عدد القطع المباعة منها 100 قطعة، فإنّ قاعدة الاقتران $P(x)$ هي:

a) $P(x) = -6\sqrt{8+x^2} - 28$

b) $P(x) = -\frac{3}{2}\sqrt{8+x^2} + \frac{29}{2}$

c) $P(x) = -6\sqrt{8+x^2} + 28$

d) $P(x) = -\frac{3}{2}\sqrt{8+x^2} - \frac{29}{2}$

(9) قيمة: $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan x \sec^3 x \, dx$ هي:

a) $\frac{1}{3}(2\sqrt{2} + 1)$

b) $\frac{1}{3}(\sqrt{2} + 1)$

c) $\frac{1}{3}(2\sqrt{2} - 1)$

d) $\frac{1}{3}(\sqrt{2} - 1)$

(10) ناتج: $\int \frac{1}{x^2(x-1)} \, dx$ هو:


a) $\ln|x| - \ln|x-1| - \frac{1}{x} + C$

b) $\ln|x| - \ln|x-1| + \frac{1}{x} + C$

c) $\ln|x-1| - \ln|x| - \frac{1}{x} + C$

d) $\ln|x-1| - \ln|x| + \frac{1}{x} + C$

(11) يُبيّن الشكل الآتي منحنى السرعة - الزمن لجسم يتحرك على المحور x في الفترة $[0, 8]$ ، إذا بدأ الجسم الحركة من $x = 5$ عندما $t = 0$ ، فإنّ إزاحة الجسم في الفترة الزمنية المعطاة هي:



(a) 14 m إلى اليمين

(b) 14 m إلى اليسار

(c) 2 m إلى اليمين

(d) 2 m إلى اليسار

الصفحة الرابعة / نموذج (١)

(12) حلّ المعادلة التفاضلية: $\frac{dy}{dx} = \frac{(x-3) \sin y}{3-x}$ الذي تحقّقه النقطة $(0, \frac{\pi}{4})$ هو:

a) $-\tan y = 3x + \frac{x^2}{2} - 1$

b) $\tan y = 3x + \frac{x^2}{2} + 1$

c) $-\cot y = 3x - \frac{x^2}{2} - 1$

d) $\cot y = 3x - \frac{x^2}{2} + 1$

(13) إذا كان: $\vec{u} = \langle 2, 4, \sqrt{k} \rangle$ ، وكان: $|\vec{u}| = 3\sqrt{3}$ ، فإنّ قيمة الثابت k هي:

a) 6

b) 7

c) 9

d) 21

(14) إذا كان: $G(-2, 3, 2), H(10, 7, 8)$ ، فإنّ مُتجه الوحدة الذي في اتجاه $\overrightarrow{GH}$ هو:

a) $\langle 12, 4, 6 \rangle$

b) $\langle -12, -4, -6 \rangle$

c) $\langle \frac{6}{7}, \frac{2}{7}, \frac{3}{7} \rangle$

d) $\langle -\frac{6}{7}, -\frac{2}{7}, -\frac{3}{7} \rangle$

(15) إذا كان مُتجه الموقع للنقطة T هو $\langle 6, -5, 1 \rangle$ ، ومُتجه الموقع للنقطة M هو $\langle 2, 3, -3 \rangle$ ، وكانت النقطة N تقع على $\overline{TM}$ بحيث أنّ: $\overrightarrow{TN} = \frac{1}{3} \overrightarrow{NM}$ ، فإنّ مُتجه الموقع للنقطة N هو:

a) $\langle -5, 3, 0 \rangle$

b) $\langle 5, -3, 0 \rangle$

c) $\langle \frac{14}{3}, -\frac{7}{3}, \frac{2}{3} \rangle$

d) $\langle -\frac{14}{3}, \frac{7}{3}, \frac{2}{3} \rangle$

(16) إذا كان: $\vec{a} = \langle 2, 0, 3 \rangle, \vec{b} = \langle -1, 1, 1 \rangle$ ، وكان: $p\vec{a} - q\vec{b} = \langle 12, -8, -2 \rangle$ ، فإنّ قيمة $p + q$ هي:

a) 10

b) -10


c) 6

d) -6

الصفحة الخامسة/نموذج (١)

17) إذا كان الشكل الآتي يُمثّل المربع $ABCD$ الذي فيه: $A(5, -2, 4), B(8, 4, 10), C(14, 7, 4)$ ، فإنّ مُتجه الموقع للنقطة D هو:

- a) $\langle 2, -8, -2 \rangle$
- b) $\langle 11, 1, -2 \rangle$
- c) $\langle -1, -5, 10 \rangle$
- d) $\langle 8, 4, 10 \rangle$




18) إذا كان: $\vec{u} = \langle -6, 9, b \rangle, \vec{v} = \langle 4, a, 6 \rangle$ ، وكان: $\vec{u} \parallel \vec{v}$ ، فإنّ قيمة الثابت a هي:

- a) 6
- b) -6
- c) 9
- d) -9

19) إذا كان الشكل الآتي يُمثّل مكعباً طول ضلعه 6 وحدات، وكانت النقطة M تُمثّل مركز المكعب، فإنّ للمستقيم l المارّ بالنقطتين B و M معادلة مُتجهة تُمثّله هي:

- a) $\vec{r} = \langle 0, 6, 6 \rangle + t\langle 1, -1, -1 \rangle$
- b) $\vec{m} = \langle 6, 0, 6 \rangle + t\langle 1, -1, -1 \rangle$
- c) $\vec{n} = \langle 3, 3, 3 \rangle + t\langle 1, -1, 1 \rangle$
- d) $\vec{p} = \langle 3, 3, 3 \rangle + t\langle -1, -1, 1 \rangle$



20) إذا كان: $|\vec{w}| = |\vec{v}| = \sqrt{2}$ ، وكان: $\vec{v} \cdot \vec{w} = -1$ ، فإنّ قياس الزاوية بين المُتجهين $\vec{w}$ و $\vec{v}$ هو:

- a) 45°
- b) 60°
- c) 120°
- d) 180°


21) إحدى التجارب الآتية تُمثّل تجربة احتمالية هندسية:

- (a) إلقاء 20 قطعة نقدية منتظمة متمايزة، ثم كتابة عدد الصور التي ظهرت
- (b) إلقاء حجر نرد منتظم ذي ستة أوجه بشكل متكرّر، ثم التوقّف عند ظهور العدد 3
- (c) اختيار 8 طلبة عشوائياً من بين طلبة صف فيه 36 طالباً، ثم تسجيل هواياتهم
- (d) فحص 100 عبوة عشوائياً من بين 5000 عبوة في مصنع للألبان، ثم تحديد التالف منها

الصفحة السادسة / نموذج (١)


(22) إذا كان: $X \sim Geo(p)$ ، وكان: $P(X > 3) = 0.512$ ، فإن تَوَقُّع المتغيّر العشوائي X هو:

- a) 1.25
- b) 1.8
- c) 4
- d) 5



(23) إذا كان منحنى التوزيع الطبيعي المجاور يُمثّل نمذجة لأطوال أقطار مسامير (بالمليمتر) التي يُنتجها مصنع، فإن الانحراف المعياري لأطوال المسامير التي يُنتجها المصنع هو:

ملحوظة: يُمكنك الاستفادة من القاعدة التجريبية الآتية:



- a) 0.4
- b) 0.2
- c) 0.6
- d) 0.1

(24) إذا كان: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ، وكان: $P(X < \mu - k) = 0.12$ ، حيث k ثابت موجب، فإن قيمة $P(\mu - k < X < \mu + k)$ هي:

- a) 0.76
- b) 0.88
- c) 0.12
- d) 0.24

(25) إذا كان: $X \sim N(230, 25)$ ، وكان: $P(230 < X < x) = 0.4$ ، فإن قيمة x هي:

ملحوظة: يُمكنك الاستفادة من الجدول الآتي الذي يُمثّل بعضاً من قيم جدول التوزيع الطبيعي المعياري.

- a) 237
- b) 236.4
- c) 237.5
- d) 235

z	0	1.28	1.29	1.5	1.75
$P(Z < z)$	0.5000	0.8997	0.9015	0.9332	0.9599

عزيزي الطالب: أجب عن الأسئلة (الثاني والثالث والرابع والخامس) على دفتر إجابتك فهو المعتمد فقط لاحتساب علامتك في هذه الأسئلة.

السؤال الثاني: (27 علامة)


(a) جد كلاً من التكاملات الآتية:

$$1) \int \frac{3x-4}{x^3+3x^2+4x+12} dx$$

(8 علامات)

$$2) \int e^{2x} \ln(2 + e^x) \, dx$$

(10 علامات)



(9 علامات)


(b) معتمداً الشكل المجاور الذي يُمثّل مُنحنيي الاقترانين:

$f(x) = 2k(x^2 - 4)$, $g(x) = k(4 - x^2)$ حيث k ثابت.

إذا كان مُنْحَنِيَا الاِقتِرَانَيْنِ يَتَقَاطِعَانِ فِي النُّقْطَةِ A وَالنُّقْطَةِ B ، وَكَانَتْ

مساحة المنطقة المظللة 16 وحدة مربعة، فجد قيمة الثابت k

السؤال الثالث: (19 علامة)



(9 علامات)

(a) يُبين الشكل المجاور مُنحنيي الاقترانين: $f(x) = 2 + \sin x$, $g(x) = 2$

جد حجم المُجسّم الناتج من دوران المنطقة المظلّلة حول المحور x

(b) يُمكن نمذجة مُعدّل تغيّر عدد الطيور في إحدى المحميّات بالمعادلة التفاضلية: $\frac{dN}{dt} = N(1 - \frac{1}{2}t)$ ،


حيث N عدد الطيور في المحمية بعد t سنة من بدء دراسة عليها. جد العدد التقريبي للطيور في المحمية بعد سنتين

من بدء الدراسة، علمًا بأنّ عددها عند بدء الدراسة هو 202 طائر.

(10 علامات)

يتبع الصفحة الثامنة ،،،

السؤال الرابع: (34 علامة)



(14 علامة)

(a) في الشكل المجاور OAQ مثلث فيه: $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{RB} = \vec{b}$ وإذا كان $OB:BQ = 1:2$ وكانت $RB = 2AR$ ، و $PQ = 2AP$ فاستعمل $\vec{a}$ و $\vec{b}$ في إثبات أن $RPQB$ شبه منحرف.

(b) إذا كانت النقطة $R(0, -2, -6)$ تقع على المستقيم l_1 الذي له معادلة مُتَّجِهة:

$\vec{r} = \langle -2, 2, 0 \rangle + u\langle 2, -4, -6 \rangle$ ، وكانت: $\vec{r} = \langle -40, -2, -1 \rangle + t\langle 7, 2, 2 \rangle$ معادلة مُتَّجِهة للمستقيم l_2 ، فأجب عن كلِّ مما يأتي:

(1) بيِّن أنَّ النقطة $S(23, 16, 17)$ تقع على المستقيم l_2

(2) جد مساحة المثلث RPS حيث P نقطة تقاطع المستقيمين l_1 و l_2 . (قَرِّب الناتج لأقرب عدد صحيح)

(20 علامة)

السؤال الخامس: (20 علامة)

(a) أجرت شركة تسويق عبر الانترنت دراسة فتبيَّن أنَّ احتمال شراء الزبون لمنتج ما من مُنْتَجَاتِها بعد التوصل معه هو $\frac{1}{4}$ ، إذا تواصلت الشركة مع 8 زبائن، وكان ثمن المنتج 8 JD، فجد كلاً مما يأتي:

(1) احتمال أن يشتري نصف الزبائن المنتج

(2) احتمال أن يكون عائد المبيعات أكثر من 48 JD

(10 علامات)


(b) بيَّنت إدارة السير أنَّ سرعة السيارات على أحد الطرق تتبع توزيعاً طبيعياً: $X \sim N(\mu, 25)$. إذا كانت السرعة القصوى المُحدَّدة على هذا الطريق 100 km/h، وكان العدد الكلي للسيارات التي تسير على هذا الطريق في أحد الأيام هو 500 سيارة، فجد العدد التقريبي للسيارات التي ستتجاوز السرعة القصوى المحددة على هذا الطريق في هذا اليوم، علماً بأنَّ سرعة 20% من السيارات التي تسير على هذا الطريق أكبر من 95 km/h

(10 علامات)

ملحوظة: يمكنك الاستفادة من الجدول الآتي الذي يُمثِّل بعضاً من قيم جدول التوزيع الطبيعي المعياري.

z	0	0.2	0.84	0.85	1.84	2
$P(Z < z)$	0.5000	0.5793	0.7995	0.8023	0.9671	0.9772

﴿ انتهت الأسئلة ﴾



إدارة الامتحانات والاختبارات

قسم الامتحانات العامة

امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٥

(وثيقة محمية/محدود)

د س

مدة الامتحان: ٣٠ : ٢

رقم المبحث: 205

المبحث: الرياضيات (الورقة الثانية، ف٢)

اليوم والتاريخ: الأحد ٢٩/٦/٢٠٢٥
رقم الجلوس:

رقم النموذج: (١)

الفرع: (أدبي، شرعي، فندقية جامعات)
اسم الطالب:

ملحوظة مهمة: أجب عن الأسئلة الآتية جميعها وعددها (5)؛ بحيث تكون إجابتك عن السؤال الأول على نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي)، وتكون إجابتك عن باقي الأسئلة على دفتر الإجابة، علماً أن عدد صفحات الامتحان (7).

السؤال الأول: (100 علامة)

اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلّل بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك في هذا السؤال، علماً أن عدد فقراته (25)، وانتبه عند تظليل إجابتك أن رمز الإجابة (a) على ورقة الأسئلة يقابله (أ) على ورقة القارئ الضوئي، و (b) يقابله (ب)، و (c) يقابله (ج)، و (d) يقابله (د).

(1) إذا كان: $f(x) = \frac{-3}{\sqrt{x}}$ ، فإن أي اقتران أصلي للاقتران $f(x)$ يُكتب على الصورة:

a) $G(x) = -6\sqrt{x} + C$

b) $G(x) = 6\sqrt{x} + C$

c) $G(x) = -\frac{3}{2}\sqrt{x} + C$

d) $G(x) = \frac{3}{2}\sqrt{x} + C$

(2) $\int x(x+4) dx$ هو:

a) $x^3 + 2x^2 + C$

b) $\frac{x^3}{3} + 4x^2 + C$

c) $x^3 + 4x^2 + C$

d) $\frac{x^3}{3} + 2x^2 + C$

(3) $\int \frac{9-x^2}{3-x} dx$ هو:

a) $3x - \frac{x^2}{2} + C$

b) $3x + \frac{x^2}{2} + C$

c) $-3x - \frac{x^2}{2} + C$

d) $-3x + \frac{x^2}{2} + C$

يتبع الصفحة الثانية ،،،

الصفحة الثانية/ نموذج (١)


4) يبيّن الشكل الآتي منحنى الاقتران $f(x)$ ، حيث $f'(x) = 3x^2 + 2x$ ، فما قاعدة الاقتران $f(x)$ ؟

a) $f(x) = x^3 + x^2 + 1$

b) $f(x) = x^3 + x^2 - 2$

c) $f(x) = x^3 - 2x^2 + 1$

d) $f(x) = 3x^3 - x^2 - 2$



* إذا كان: $\int_1^4 h(x)dx = -5$ ، $\int_1^2 f(x)dx = 7$ ، $\int_1^4 f(x)dx = 31$ ، فأجب عن الفقرتين 5 و 6 الآتيتين:

5) قيمة $\int_4^1 (4h(x) - 2) dx$ ، تساوي:

a) 26

b) -26

c) -14

d) 14

6) قيمة $\int_2^4 f(x) dx - \int_1^1 h(x)dx$ ، تساوي:

a) 19

b) 24

c) -24

d) -19

7) إذا كان: $\int_1^4 (kx)dx = 60$ ، فإنّ قيمة الثابت k تساوي:

a) 40

b) 20

c) 8

d) 4

8) مساحة المنطقة المحصورة بين منحنى الاقتران: $f(x) = -\sqrt{x}$ ، والمحور x ، والمستقيم $x = 9$ بالوحدات المربعة، هي:

a) 36

b) 27


c) 9

d) 18

يتبع الصفحة الثالثة ،،،

الصفحة الثالثة/ نموذج (١)

(9) يبين الشكل الآتي منحنى الاقتران $f(x)$. إذا كانت مساحة المنطقة المظللة R هي 4 وحدات مربعة، وكان: $\int_{-2}^2 f(x)dx = 14$, $\int_{-1}^3 f(x)dx = 8$ ، فما قيمة $\int_2^3 f(x)dx$ ؟



- a) -10
- b) 10
- c) -2
- d) 2

(10) قيمة $\int_0^1 e^x(1 - 2e^x)dx$ تساوي:

- a) $e - e^2$
- b) $e^2 - e$
- c) $e - e^2 - 2$
- d) $e^2 - e - 2$

(11) إذا كان: $R'(t) = \frac{20}{t+1} + 3$ ، وكان $R(0) = 5$ ، فإن $R(t)$ ، هو:

- a) $20 \ln|t + 1| + 3t - 5$
- b) $20 \ln|t + 1| + 3t + 15$
- c) $20 \ln|t + 1| + 3t + 5$
- d) $20 \ln|t + 1| + 3t - 15$

(12) $\int 20(2x + 1)^9 dx$ هو:

- a) $2(2x + 1)^{10} + C$
- b) $10(2x + 1)^{10} + C$
- c) $(2x + 1)^{10} + C$
- d) $20(2x + 1)^{10} + C$

(13) $\int (2 - 4 \cos(1 - 4x)) dx$ هو:

- a) $2x - \frac{1}{4} \sin(1 - 4x) + C$
- b) $2x - \sin(1 - 4x) + C$
- c) $2x + \frac{1}{4} \sin(1 - 4x) + C$
- d) $2x + \sin(1 - 4x) + C$

(14) $\int \frac{\sin x}{\cos x} dx$ هو:

- a) $\ln|\cos x| + C$
- b) $-\ln|\cos x| + C$
- c) $\ln|\sin x| + C$
- d) $-\ln|\sin x| + C$

يتبع الصفحة الرابعة ،،،

(15) قيمة $\int_1^e \frac{3}{x} (\ln x)^2 dx$ تساوي:

- a) $e^3 - 1$
- b) $3e - 1$
- c) 0
- d) 1

(16) إذا دلّ المتغير العشوائي X على عدد المحاولات في تجربة إلقاء حجر نرد سداسي مُنتظم، والتوقف عند ظهور العدد 5 لأول مرة، فأَي مِمَّا يَأْتِي يُعبر عن ذلك بالرموز؟

- a) $X \sim B\left(5, \frac{1}{6}\right)$
- b) $X \sim Geo\left(\frac{1}{6}\right)$
- c) $X \sim B\left(5, \frac{5}{6}\right)$
- d) $X \sim Geo\left(\frac{5}{6}\right)$

(17) إذا كان: $X \sim Geo(0.6)$ ، فإنّ $P(X = 3)$ يساوي:

- a) 0.336
- b) 0.144
- c) 0.904
- d) 0.096

(18) إذا كان: $X \sim Geo(p)$ ، وكان $E(X) = 5$ ، فإنّ $P(X > 2)$ يساوي:

- a) $\frac{1}{5}$
- b) $\frac{4}{5}$
- c) $\frac{16}{25}$
- d) $\frac{1}{25}$

(19) إذا كان: $X \sim B(5, 0.3)$ ، فإنّ قيمة $P(3 \leq X < 4)$ تساوي:

- a) 0.1323
- b) 0.02835
- c) 0.16065
- d) 0.3087

(20) إذا كان: $X \sim B(n, p)$ ، وكان $E(X) = 14$ ، $Var(X) = 5.6$ ، فإنّ قيمة p ، هي:

- a) 0.4
- b) 0.6
- c) 0.071
- d) 0.178

الصفحة الخامسة/ نموذج (١)

(21) إذا كان: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ، وكان $P(X < \mu + 2\sigma) = 0.975$ ، فإن النسبة المئوية للبيانات التي تقلّ عن الوسط الحسابي بمقدار لا يزيد على انحرافين معياريين ، هي:

- a) 97.5%
- b) 2.5%
- c) 47.5%
- d) 95%

(22) إذا كان: $Z \sim N(0, 1)$ ، وكان $P(-z < Z < z) = 0.697$ ، فإنّ $P(Z > z)$ يساوي:

- a) 0.303
- b) 0.3485
- c) 0.197
- d) 0.1515

(23) إذا كان: $Z \sim N(0, 1)$ ، وكان $P(0 < Z < 1.5) = 0.4332$ ، فإنّ $P(Z < -1.5)$ يساوي:

- a) 0.9332
- b) 0.5668
- c) 0.0668
- d) 0.4332

(24) إذا كان: $X \sim N(36, 3^2)$ ، فإنّ قيمة x التي تُقابل القيمة المعيارية $z = -2$ ، هي:

- a) 54
- b) 30
- c) 42
- d) 18

(25) يُمثّل المتغير العشوائي X كتل 2000 كيس معبأة بحبوب العدس (بالغرام). حيث $X \sim N(450, 4)$.

إذا علمت أنّ $P(Z < 2.5) = 0.9938$ ، $P(Z < 1.25) = 0.8944$ ، فما عدد أكياس العدس التي يقلّ كتلة كلّ منها عن 445 g تقريباً؟

- a) 12
- b) 211
- c) 1988
- d) 1789

عزيزي الطالب: أجب عن الأسئلة (الثاني والثالث والرابع والخامس) على دفتر إجابتك فهو المعتمد فقط لاحتساب علامتك في هذه الأسئلة.

السؤال الثاني: (29 علامة)

(a) إذا كان ميل المماس لمنحنى الاقتران $f(x)$ هو: $\left(2 - \frac{50}{x^2}\right)$ ، وكان للاقتران نقطة حرجة عند النقطة $(a, 5)$ ،
حيث: $a > 0$ ، فجد قاعدة هذا الاقتران. (10 علامات)

(b) إذا كان: $f(x) = \begin{cases} 4x^3 & , x < 2 \\ 36 - 2x & , x \geq 2 \end{cases}$ ، فجد قيمة $\int_1^4 f(x)dx$. (7 علامات)

(c) جد مساحة المنطقة المحصورة بين منحنى الاقتران: $f(x) = x^3 - 25x$ ، والمحور x . (12 علامة)

السؤال الثالث: (25 علامة)

(a) جد كلاً من التكاملات الآتية:

1) $\int_0^{13} \frac{1}{\sqrt[3]{2x+1}} dx$

2) $\int x^4 \sin(3 - x^5) dx$

(b) يتحرك جُسيم في مسار مستقيم، وتُعطى سرعته بالاقتران: $v(t) = \frac{-6t}{\sqrt{(1+t^2)^5}}$ ، حيث t الزمن بالثواني، و v سرعته بالمتراً لكل ثانية. إذا كان الموقع الابتدائي للجُسيم 5 m ، فجد موقع الجُسيم بعد t ثانية من بدء الحركة.

(12 علامة)

السؤال الرابع: (18 علامة)

(a) تنتظر سيدة مرور سيارة أجرة أمام منزلها. وكانت 4% من السيارات المارة أمام منزلها هي سيارة أجرة. إذا مثل X عدد السيارات التي ستمر أمام منزل السيدة حتى مرور أول سيارة أجرة، فما احتمال مرور أقل من 4 سيارات حتى مرور أول سيارة أجرة ؟ (7 علامات)

(b) إذا كان: $X \sim B\left(n, \frac{1}{3}\right)$ ، وكان $\text{Var}(X) = 4$ ، فما قيمة $P(X \leq 1)$ ؟ (11 علامة)


يتبع الصفحة السابعة ،،،

السؤال الخامس: (28 علامة)

(a) إذا كان: $X \sim N(40, 36)$ ، فاستعمل القاعدة التجريبية

والشكل المجاور الذي يُمثل توزيعاً طبيعياً للإجابة

عن كلّ ممّا يأتي:



(4 علامات)

(1) ما قيمة $P(X > 22)$ ؟

(6 علامات)

(2) ما قيمة a التي تحقق الاحتمال: $P(34 < X < a) = 0.815$ ؟

(b) يُمثّل المتغير العشوائي X حجم الزيت المعبأ في 5000 قارورة من إنتاج إحدى الشركات (بالمليتر).

حيث $X \sim N(500, 9)$. فأجب عن الأسئلة الآتية:

(7 علامات)

(1) ما نسبة القوارير التي يزيد فيها حجم الزيت على 506 mL ؟

(2) قرّر قسم الجودة في الشركة إعادة تعبئة 10 قوارير، حيث إنّها تحتوي على زيت حجمه

(11 علامة)

أقلّ من k mL ، فما قيمة k ؟

ملاحظة: يمكنك الاستفادة من الجدول الآتي الذي يتضمّن قيمًا مأخوذة من جدول التوزيع الطبيعي المعياري.

z	0.66	1	2	2.8	2.88
$P(Z < z)$	0.7454	0.8413	0.9772	0.9974	0.9980

﴿ انتهت الأسئلة ﴾

قوله الصفحة
عزير
مخصصة
للإجابة